SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

IL MORBILLO

Il morbillo è una **grave malattia infettiva esantematica altamente contagiosa**, causata da un **virus**. Non esiste nessuna terapia specifica per il morbillo e la vaccinazione è l'unica vera arma per arrestare la trasmissione del virus e prevenire la diffusione dell'infezione.

COME SI TRASMETTE

Il virus si trasmette facilmente per **via aerea** attraverso le goccioline respiratorie quando una persona infetta respira, tossisce o starnutisce.

CHI COLPISCE E COME SI MANIFESTA

L'infezione è **più comune nei bambini, ma può colpire chiunque**.

Dopo un'incubazione di circa 10-14 giorni, si manifesta inizialmente con **febbre**, che dopo 2-4 giorni diventa alta, **malessere, congiuntivite, raffreddore e tracheobronchite con tosse**.
L'**esantema**, sotto forma di eruzione cutanea maculopapulare eritematosa, dura circa 10-20 giorni.

LE COMPLICANZE

Le complicanze più frequenti del morbillo sono le **infezioni dell'orecchio medio (otite), la polmonite, la laringite, la diarrea**.
Seppur raramente, possono manifestarsi **complicanze più temibili che colpiscono il sistema nervoso (encefalite)**.

Il **rischio di complicazioni gravi e di morte è maggiore nei bambini di età inferiore ai 5 anni e negli adulti di età superiore ai 20 anni**.
In gravidanza è associato a un **aumento del rischio di complicazioni materne, fetali e neonatali**.
I soggetti immunocompromessi (per esempio, persone sottoposte a chemioterapia o con infezione da HIV) presentano un **decorso prolungato, grave e spesso fatale**.

LA VACCINAZIONE

Il vaccino contro il morbillo è efficace e sicuro ed è **gratuito per tutti** e, **dal 2017**, il **vaccino contro Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella (MPRV) è obbligatorio per i bambini e gli adolescenti**.

Il **Calendario Vaccinale** prevede l'offerta della vaccinazione anche per tutti gli **operatori sanitari e scolastici suscettibili**, per soggetti appartenenti a **categorie di rischio per patologia**, ai **contatti stretti di un caso di morbillo** (**profilassi post-esposizione** da eseguire entro 72 ore dal contatto).
Inoltre la vaccinazione è raccomandata per i **soggetti adulti suscettibili di età 18-59** anni e per i **viaggiatori suscettibili che si recano in aree endemiche**.

QUANDO RINVIARE LA VACCINAZIONE O QUANDO E' CONTROINDICATA

La vaccinazione va **rinviata** in caso di: malattia acuta con febbre o disturbi generali clinicamente importanti; recente somministrazione di immunoglobuline, sangue o plasma; recente somministrazione di un altro vaccino a base di virus vivi; gravidanza.

Il vaccino è **controindicato** nei seguenti casi: gravi reazioni allergiche a costituenti del vaccino (es. neomicina o gelatina) o a precedenti somministrazioni dello stesso vaccino; discrasie ematiche, leucemie, linfomi di qualunque tipo o altre neoplasie maligne del sistema, ematopoietico e linfatico; terapia immunosoppressiva in corso (comprese dosi elevate di corticosteroidi); grave immunodeficienza umorale o cellulare (primaria o acquisita); storia familiare di immunodeficienza congenita o ereditaria, a meno che non sia dimostrata l'immunocompetenza del potenziale destinatario del vaccino; tubercolosi attiva non trattata.

Per effettuare la vaccinazione ci si può recare ad **ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE** dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 presso i Centri Vaccinali della ASL Roma 2 di seguito elencati:

- **Municipio/Distretto Sanitario D/4 - Via del Frantoio, 62**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/5 - Via degli Eucalipti, 14**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/5 - Viale Telese, 80**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/6 - Viale Duilio Cambellotti, 11**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/7 - Via Monza, 2**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/8 - Via del Casale de Merode, 8**
- **Municipio/Distretto Sanitario D/9 - Viale Ignazio Silone, 100**