

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C.. Coordinamento delle Attività Vaccinali
Direttore ff: dottor Giovanni Colaiocco
Via Monza, 2 - 00182 Roma Via Monza, 2 - 00182 Roma
tel. 06/5100.7606
e-mail: centri.vaccinali@aslroma2.it

Gentile Dirigente Scolastico,

è con piacere che Le trasmettiamo la lettera di invito alla vaccinazione gratuita e senza prenotazione per i nati negli anni 2011 al 2014 con la preghiera di diffusione tra i genitori degli alunni.


Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in vigore sottolinea come l'adolescenza sia un momento molto importante sia per la somministrazione delle dosi di richiamo delle vaccinazioni effettuate nell'infanzia sia per l'effettuazione di nuove vaccinazioni elettive per questo periodo della vita.

Abbiamo pertanto scelto di offrire ai ragazzi la possibilità di vaccinarsi nel mese di Marzo, presentandosi in accesso libero e senza prenotazione presso i Centri Vaccinali del nostro territorio, nei giorni e negli orari indicati nella lettera di invito, per effettuare le importantissime vaccinazioni raccomandate contro il Papillomavirus ed il Meningococco, nonché il richiamo obbligatorio anti Difterite, Tetano, Pertosse e Polio. Nella comunicazione per i genitori vengono altresì riportate le indicazioni per eventuale prenotazione e brevi note sul razionale della vaccinazione.


Auspichiamo che l'allegato possa essere diffuso attraverso il Registro Elettronico affinché abbia capillare visibilità.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

U.O.C. Coordinamento delle Attività Vaccinali
Il Direttore ff
Dott. Giovanni Colaiocco



U.O.S.D. Promozione della Salute,
Piani di Prevenzione e Medicina dello Sport
La Responsabile
Dott.ssa Giulia Cairella



INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA PER I NATI DAL 2014 AL 2011

CONTRO IL PAPPILLOMAVIRUS (HPV) CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPO B) CONTRO LO PNEUMOCOCCO (PCV) CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)

MESE MARZO 2026

IN ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE

presso i seguenti Centri Vaccinali, nei giorni e negli orari indicati:

- ✚ **Centro Vaccinale Frantoio via del Frantoio 62** (IV Municipio)
Tutti i LUNEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Eucalipti 14** (V Municipio)
Tutti i MARTEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Cambellotti 11** (VI Municipio)
Tutti i LUNEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Monza 2** (VII Municipio)
Tutti i MARTEDÌ e MERCOLEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Casale de Merode 8** (VIII Municipio)
Tutti i LUNEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30
- ✚ **Centro Vaccinale via Silone 100** (IX Municipio)
Tutti i MERCOLEDÌ di Marzo ore 14.00-16.30

È necessario presentarsi al Centro Vaccinale muniti di certificato vaccinale.

VI ASPETTIAMO!

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PRENOTARE IN ALTRI GIORNI, IN ALTRI ORARI, IN TUTTI I CENTRI VACCINALI:

- accedendo on-line al sito <http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini>
- inoltrando una richiesta via e-mail a prenotavaccini@aslroma2.it indicando dati anagrafici, sede e giorno di preferenza per la vaccinazione

PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

Il virus del HPV è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi genitali.

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per

trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

- **quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il batterio del Meningococco rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).

Non esiste un solo meningococco, ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età.

L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

- **quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I vaccini possono essere co-somministrati.

Il vaccino anti-Pneumococco previene le più comuni polmoniti batteriche ma anche, meningiti e sepsi (infezione del sangue). Le patologie pneumococciche si verificano durante tutto l'anno e sono più frequenti nei bambini non protetti e negli anziani. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio è la quinta dose di richiamo obbligatoria di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia (tre esavalenti e richiamo dei 6 anni).

Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.

È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita: si tratta di una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sempre gratuita. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Per info: centri.vaccinali@aslroma2.it